LES NOMBRES COMPLEXES

I Définition

On admet l'existence d'un nombre réel noté i dont le carré est -1 $i^2 = -1$. On appelle nombre complexe tout nombre qui s'écrit sous la forme $x + iy$, avec x et y réels. Ces nombres constituent l'ensemble des nombres complexes notés C .

Les règles de calcul dans R s'étendent à C (addition, multiplication...)

Remarque :

$$\text{Si } y = 0, 0 \cdot i = 0$$

$$x + iy = x, \text{ réel}$$

→ R est contenu dans C

$$\text{Si } x = 0, x + iy = iy \rightarrow \text{imaginaire pur.}$$

II Ecriture algébrique d'un nombre complexe

Soit z un nombre complexe

1) Propriété

Tout complexe z s'écrit de façon unique sous la forme $x + iy$, avec x et y réels. - cette écriture est l'écriture algébrique.

$$x : \text{partie réelle de } z : \text{Re}(z) = x$$

$$y : \text{partie imaginaire de } z : \text{Im}(z) = y$$

Conséquences de la propriété :

$$z = 0 : \text{SSI } x = 0 \text{ et } y = 0$$

$$z = z' \text{ SSI } \text{Re}(z) = \text{Re}(z') \text{ et } \text{Im}(z) = \text{Im}(z')$$

Exemples :

z	$\text{Re}(z)$	$\text{Im}(z)$
$4 + 5i$	4	5
$3i$	0	3
3	3	0
$\sqrt{2} - \frac{1}{7}i$	$\sqrt{2}$	$-\frac{1}{7}$

Exercice : voir cours papier.

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$

$$i^5 = i$$

$$i^6 = -1$$

$$i^7 = -i$$

$$i^{4n} = (i^4)^n = 1$$

$$i^{4n+1} = (i^4)^n * i^1 = i$$

$$i^{4n+2} = (i^4)^n * i^2 = -1$$

$$i^{4n+3} = (i^4)^n * i^3 = -i$$

III Aspect géométrique des nombres complexes

1) Plan complexe :

Repère orthonormal : $(O, \vec{u}, \vec{v})$ ou $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

2) Représentation d'un nombre complexe à tout point $M(x; y)$ on associe le nombre complexe $z = x + iy$ z s'appelle l'affixe du point M (ou l'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$)

M s'appelle l'image ponctuelle de Z, OM est l'image vectorielle de z.

IV Complexes et opérations

$$z = x + iy$$

$$z' = x' + iy'$$

x, y, x', y' , réels

1) Addition

a) Définition

$$z + z' = (x + x') + i(y + y')$$

b) Propriétés : celles de l'addition dans R

c) Opposé et soustraction

L'opposé de z est $-z = (-x) + i(-y)$

$$z' - z = z' + (-z) = (x' - x) + i(y' - y)$$

d) Représentation géométrique de la somme

M d'affixe z $\overrightarrow{OM}$ d'affixe z

M' d'affixe z' $\overrightarrow{OM'}$ d'affixe z'

S d'affixe $(z + z')$

$\overrightarrow{OS}$ d'affixe $(z + z')$

$$\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'}$$

Si M et M' ont pour affixe z et z', alors S d'affixe $(z + z')$ est tel que OMSM' est un parallélogramme.

e) Représentation géométrique de l'opposé

soit M(z) et N(-z) $\overrightarrow{OM} = -\overrightarrow{ON}$

f) représentation géométrique de la différence

M d'affixe z , $\overrightarrow{OM}$ d'affixe z
 M' d'affixe z' , $\overrightarrow{OM'}$ d'affixe z'

E d'affixe $(z' - z)$
 $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'} + \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{MM'}$

Si z et z' sont les affixes de M et M' alors $(z' - z)$ est l'affixe de E tel que $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{MM'}$

Exemples :

soit : $A(3 - 2i)$

$B(-1 + 4i)$

Placer :

C d'affixe $z_A + z_B$

D d'affixe $-z_A$

E d'affixe $-z_B$

F d'affixe $z_A - z_B$

G d'affixe $z_B - z_A$

2) Multiplication d'un réel par un complexe

a) définition

Soit k un réel, z un complexe $kz = kx + ki y$

b) représentation géométrique

Soit M et $\overrightarrow{OM}$ d'affixe z . N et $\overrightarrow{ON}$ d'affixe kz , k réel

$$\overrightarrow{ON} = k \cdot \overrightarrow{OM}$$

N est l'image de M par l'homothétie de centre O et de rapport k .

O, N, M alignés. $\overrightarrow{ON}$ et $\overrightarrow{OM}$ de même sens si $k > 0$; de sens contraire si $k < 0$ et confondus ou égaux si $k = 1$.

Si $k = 0$, $\overrightarrow{ON} = \vec{0}$

$$ON = OM * |k|$$

3) Multiplication de deux complexes

a) définition

$$z.z' = (x + iy).(x' + iy')$$

$$= (x.x' - y.y') + i (x.y' + x'.y)$$

b) Propriétés : Les mêmes que dans R

c) Inverse d'un complexe non nul

$$z \neq 0$$

$z = 0$ SSI $x = 0$ et $y = 0$ donc $z \neq 0$ SSI $x \neq 0$ ou $y \neq 0$.

$$\frac{1}{z} = \frac{1 \times (x - iy)}{(x + iy) \times (x - iy)}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{-y}{x^2 + y^2} \times i$$

d) quotient de deux complexes

$$\frac{z'}{z} = \frac{(x' + iy')(x - iy)}{(x + iy)(x - iy)}$$

$$\frac{z'}{z} = \frac{x'x + iy'x - x'iy + i^2yy'}{x^2 + y^2} = \frac{x'x + yy' + i(xy' - x'y)}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{z'}{z} = \frac{x'x + yy'}{x^2 + y^2} + i \frac{xy' - x'y}{x^2 + y^2}$$

Exemples : voir cours

V Nombres complexes et conjugués

1) Définition

On appelle conjugué de z , le nombre noté $\bar{z}$.

Tel que :

$$\operatorname{Re}(\bar{z}) = \operatorname{Re}(z)$$

$$\operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z)$$

Si $z = x + iy$, x et y réels, alors $\bar{z} = x - iy$

2) Propriétés :

a) $z = \bar{\bar{z}}$

b) $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$

$$z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$$

c) $z = \bar{z}$: y est nul $\rightarrow z$ est réel

$$z + \bar{z} = 0$$
 : z est un imaginaire pur ($\bar{z} = -z$)

d) $z \bar{z} = x^2 + y^2$

$z \bar{z}$ est un réel positif

3) Opérations et complexes :

$z = x + iy$, $z' = x' + iy'$, x, x', y, y' réels.

a) Conjugué d'une somme

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

b) Conjugué d'une différence

$$\overline{z - z'} = \bar{z} - \bar{z}'$$

c) Conjugué d'un produit

$$\overline{z.z'} = \bar{z}.\bar{z}'$$

d) Conjugué d'un quotient

$$\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}} \quad \text{et} \quad \overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z}'}{\bar{z}}$$

e) Conjugué d'une puissance

$$\overline{z^n} = (\overline{z})^n$$

4) représentation graphique

z et $\overline{z}$ sont les affixes de deux points symétriques par rapport à l'axe des réels.

VI Résolution d'équations

Voir cours papier !

VII Recherche d'ensemble de points

Exemple :

42 p 83

Rappel :

Equation d'un cercle C de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon r .

$$M(x; y) \in C \Rightarrow \Omega M = r$$

$$\Leftrightarrow \Omega M^2 = r^2$$

$$\Leftrightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

d'où équation du cercle : $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$