Equilibre de complexes

Les complexes

Ligands L et métal M

Stoechiométrie : $Fe^{3+} + SCN^- = [Fe(SCN)]^{2+}$ stoech (1,1)

Ligands polydentates :

EDTA : tétradentate

Constante de formation, constante de dissociation

$$M_{aq} + nL_{aq} = ML_{naq} \quad \beta_n = \frac{[ML_n]}{[M][L]^n} \text{ Constante de formation globale}$$

$$ML_{naq} = M_{aq} + nL_{aq} \quad K_d = \frac{[M][L]^n}{[ML_n]} \text{ Constante de dissociation globale}$$

$$\beta = \frac{1}{K_d}$$

⋮

Plus β est grand, plus le complexe est stable. $K_{d_i} = \frac{[ML_{i-1}][L]}{[ML_i]}$ constante de dissociation successive.

Diagramme de prédominance

1) en fonction de pL

$$K_{f_i} = \frac{1}{K_{d_i}} \text{ Frontière : } pL = pK_{d_i}$$

Si pL augmente, [L] diminue donc il y a moins de ligands dans le complexe ML_{i-1}

2) en fonction de pM

Frontière : $pM = pK_d$

3) Une dismutation :

Les 2 espèces qui prédominent normalement sont des domaines de prédominance disjoint $\rightarrow$ ils réagissent

Prévision de réactions

Compétition de ligands

On calcule les K_f si $K = \frac{K_{f1}}{K_{f2}} \gg 1$ Alors la réaction avec le 2^{ème} ligand se fait

Compétition de métaux

$\rightarrow$ Tableau d'avancement $K = \frac{\beta}{\beta'} = \frac{x^2}{(0,1-x)^2}$ (dans l'exemple du cours) on détermine x puis les concentrations de chaque complexe.

Couplage avec une réaction acido-basique

Réactions successives