Corps des réels $\mathbb{R}$ I Ordre usuel

$(\mathbb{R}, +, \times)$ est un corps commutatif

L'ordre usuel dans $\mathbb{R}$ est une relation d'ordre totale.

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \leq y \text{ ou } y \leq x$$

La relation d'ordre est compatible avec + et avec $\times$.

M est un majorant de A lorsque $\forall x \in A, x \leq M$

Si A est majorée, la borne supérieure de A (si elle existe) est le plus petit élément de l'ensemble des majorants de A

On le note $\text{Sup } A$.

$A \subset \mathbb{R}$

$$\alpha = \sup(A) \Leftrightarrow \begin{cases} \forall x \in A, x \leq \alpha \\ \forall x \in \mathbb{R}, \text{ Si } x < \alpha \text{ alors } x \text{ n'est pas un majorant de } A \end{cases}$$

Théorème :

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure

De la même manière, on définit $\text{Inf}(A)$

II Valeur absolue

$\forall x \in \mathbb{R}$, la valeur absolue de x est le réel $\sup\{-x; x\}$

$$1) \quad |-x| = |x| \quad ; \quad 0 \leq |x| \quad ; \quad |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$2) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad |x \times y| = |x| \times |y|$$

$$3) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad |x + y| \leq |x| + |y| \quad \quad ||x| - |y|| \leq |x + y|$$

$|x - y|$ est appelée la distance de x à y .

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0 \Leftrightarrow x \in [a - \varepsilon ; a + \varepsilon]$

$$\text{Formules pratiques : } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \sup\{x; y\} = \frac{x + y + |y - x|}{2} \quad \inf\{x; y\} = \frac{x + y - |y - x|}{2}$$

III Partie entière

Soit $x \in \mathbb{R}$, on appelle partie entière de x l'entier $E(x)$ qui vérifie : $E(x) \leq x < E(x) + 1$

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall p \in \mathbb{Z} \quad x = E(x) \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z} \quad E(x + p) = E(x) + p$$

E n'est pas injective. E est une application croissante. E n'est pas surjective.

IV Intervalle de $\mathbb{R}$

Définition : Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$

Le segment $[a, b]$ est l'ensemble des réels compris (au sens large (différent de strictement)) entre a et b .

$$I \subset \mathbb{C} ; I \text{ intervalle de } \mathbb{R} \Leftrightarrow (\forall (x, y) \in I^2, \forall t \in [0, 1], (1-t)x + ty \in I)$$

V Rationnels et irrationnels

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}^* \right\} \text{ Ensemble des rationnels}$$

$\mathbb{R} / \mathbb{Q}$: Ensemble des irrationnels

Théorème : Le corps $\mathbb{R}$ est archimédien : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}^+, \exists p \in \mathbb{N}, y \leq px$

Propriété :

$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, Si $x < y$ alors $\exists r \in \mathbb{Q}$ tel que $x < r < y$

Entre 2 réels distincts, il existe une infinité de rationnels.

Propriété :

$\forall (x, y) \in \mathbb{Q}^2$ Si $x < y$ alors $\exists r \in \mathbb{Q}$ tel que $x < r < y$

Et, entre 2 réels distincts, il existe une infinité d'irrationnels.